

Artenliste Vögel, naturus Reise Extremadura 21.-30. April 2014

$x = < 10$ Ind.

xx = > 10 Ind.

$xxx = > 100 \text{ Ind}$

* = Beobachtungen aus Car

¹⁾ – Santa Marta de Macassar

– Santa M

| | 21.4. | Toril / Monfragüe | 22.4. | Valle del Jerte | 23.4. | Villareal de San Carlos | 24.4. | Embalse di Guadioba / Vor Santa Marta de Magasca | 25.4. | Alcantara | 26.4. | Embalse di Talavan | 27.4. | Monroy | 28.4. | Südlich von Malpartida de Cáceres | 29.4. | Los Barruecos | 29.4. | Montánchez | 29.4. | Torreorgaz | 29.4. | Steppengebiete vor Santa Marta de Magasca | 30.4. | Embalse di Almaraz / Kalkrippe (K) |
|----------------|-------|-------------------|-------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------|---|------------|-----------|-------|--------------------|-------|--------|-------|--------------------------------------|-------|---------------|-------|------------|-------|------------|-------|--|----------|---------------------------------------|
| Gänsegeier | xxx | xx | xxx | xx | xx | | | | xx | | xx | | | | x | | | xx | | | xx | | | xx | | xx |
| Mönchsgeier | x | | x | x | x | | x | | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Schmutzgeier | x | | x | 1 | x | | | | | | | | | 1 | 1* | | | | | | | | | 1 | | |
| Schlangenadler | x | x | x | 2 | x | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | 1 (K) | | |
| Zwergadler | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Habichtsadler | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Rotmilan | x | 1* | 1* | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | |
| Schwarzmilan | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | x | x | x | xx | xx | xx | xx | x | x | xx | x | xx | x | xx | x | xx | | |
| Wiesenweihe | x* | | 1w | 1w / x ¹⁾ | | | | | 1 (melan.) | | | | | | | | | | | | | | | ca. 10 | | |
| Mäusebussard | x | x | x* | | | | | 2* | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | |
| Sperber | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gleitaar | | 1* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Turmfalke | x | | 1 | x? | x? | x? | | | | | | 1 | | | 1? | | | | | | | | | x | | |
| Rötelfalke | | | | x? | x? | x? | | | | | | | | | 1? | x / x ²⁾ | ? | | | | | | | | | |
| Wanderfalke | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wasserralle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 (Rufe) | |
| Teichhuhn | | | | | 1 (Rufe) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | xx | |
| Blässhuhn | | | | | | x* | | x | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | xx | |
| Purpurhuhn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| Grosstrappe | | | | | ca. 40 / 5 ¹⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ca. 10 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------------------|-----------|-----------------|-------|-------------------------|-------|--|-------|-----------|-------|--------------------------|
| x = < 10 Ind. | | | | | | | | | | | | |
| xx = > 10 Ind. | | | | | | | | | | | | |
| xxx = > 100 Ind. | | | | | | | | | | | | |
| * = Beobachtungen aus Car | | | | | | | | | | | | |
| ¹⁾ = Santa Marta de Magasca | | | | | | | | | | | | |
| ²⁾ = Cáceres | | | | | | | | | | | | |
| Zwergtrappe | 21.4. | Toril / Monfragüe | 22.4. | Valle del Jerte | 23.4. | Villareal de San Carlos | 24.4. | Embalse di Guadijoba / Vor Santa Marta de Magasca | 25.4. | Alcantara | 26.4. | Embalse di Talavan 2m |
| Stelzenläufer | | | | 2 | | | | | | | 2 | |
| Rotflügel-Brachschwalbe | | | | | | | | 2 | | | | 1 |
| Flussregenpfeifer | | | 2 | 2 / 2* | | | | | | 1 | 1 | |
| Flussuferläufer | | | | 2 | | | | | | | | 1 |
| Lachseeschwalbe | | | | | | | | | | | | x |
| unbest. Seeschwalbe | | | | 2 | | | | | | | | |
| Sandflughuhn | | | | | >9 | | | | | | | 7 |
| Spiessflughuhn | | | | | | ca. 150 | | | | | | |
| Strassentaube | xx | xx* | xx | | xx | | | xxx | | xxx | xx | |
| Ringeltaube | xx | xx* | xx | x | | 1 | | | | | 1 | |
| Türkentaube | xx | x* | x | | x | x | x | x* | x | x* | x* | x* |
| Kuckuck | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | | |
| Häherkuckuck | | | | | | 2 | | | | | 2 | |
| Steinkauz | | | | 1 ¹⁾ | 1* | >2 | 1 | | 1 | | 2 | 2 |
| Mauersegler** | x? | x? | x? | x | x? | x? | x? | x? | x? | x? | x? | x? |
| Fahlsegler** | x? | x? | x? | ? | x? | x? | x? | x? | x? | x? | x? | x? |
| Alpensegler | | | | 1 | | | | | | | | |
| Wiedehopf | x | 1 (Hotel) | 1 (Hotel) | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x |
| Eisvogel | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 |

$x = < 10$ Ind.

$xx = > 10$ Ind.

$xxx = > 100 \text{ Ind}$

* = Beobachtungen aus Ca

¹⁾ = Santa Marta de Magasca

2) Cáceres

$x = < 10$ Ind.

$xx = > 10$ Ind.

xxx = > 100 Ind

* = Beobachtungen aus Ca

¹⁾ = Santa Marta de Magasca

2) Cáceres

$x = < 10$ Ind.

$xx = > 10$ Ind.

$xxx = > 100 \text{ Ind}$

* = Beobachtungen aus Ca

¹⁾ = Santa Marta de Magasca

2) Cáceres

$x = < 10$ Ind.

$xx = > 10$ Ind.

$xxx = > 100 \text{ Ind}$

* = Beobachtungen aus Car

¹⁾ = Santa Marta de Maasico

2) Cálculos

**** Sichere Artbestimmung zwischen Mauer- u. Fahlsegler sowie Hauben- u. Theklalerche oft sehr schwierig!**

Spezielle Beobachtungen:

Schwarzstorch

2 besetzte Felsenhorste bei Monfragüe (Geierfelsen).

1 Ind. überfliegt den Stausee von Almaraz

sehr häufig, täglich schöne Beobachtungen

Je 1 immat. Ind. bei Alcantara und südlich von Malpartida de Cáceres

1 melanistisches Ind. beim Stausee von Talavan

Je 1 Ind. auf der Fahrt Richtung Toril und am Stausee von Almaraz

Einige Ind. beim Stausee von Almaraz

2 Männchen beim Stausee von Talavan

Die schönsten Beobachtungen in den Steppengebieten vor Santa Marta de Magasca.

Total ca. 150 Ind. in der Umgebung vom Stausee von Talavan

Je 2 Ind. beim Stausee von Talavan und in Torreorgaz

Spektakuläre Balzflüge in Torreorgaz